

## **ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ „РЕФОРТАН-ПЛЮС” У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ІНФАРКТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ**

*Монастирський В.О., лікар 4-ї МКЛ*

*Науковий керівник – доц. Коленко Ф.Г.*

Найбільш частим та грізним ускладненням ішемічного інсульту є набряк головного мозку, який виникає вже через декілька хвилин після розвитку локальної ішемії. Вираженість набряку мозку перебуває в прямій залежності від розмірів інфаркту мозку, особливо при великих атеротромботичних та кардіоемболічних інсультах.

На фармацевтичному ринку України з'явився препарат “Ре-фортан-плюс”, який являє собою 10% гідроксиетилкрохмаль, який чинить реологічну та м'яку дегідратуючу дію, поліпшує мікроциркуляцію. Препарат призначався 30 хворим на інфаркт головного мозку по 500 мл розчину внутрішньовенно протягом 3-5 днів з наступним введенням 40 мг лазиксу. У хворих, які отримували рефортан-плюс, регрес ознак набряку мозку наставав раніше, ефект був більш вираженим та стійким. У випадках легкого перебігу інфаркту мозку препарат призначався у вигляді монотерапії, а при вираженому набряку мозку - в комбінації з глюкокортикоїдами, що дало змогу застосувати менші дози рефортану-плюс, скоротити термін лікування та зменшити ризик ускладнень гормональної терапії при отриманні інтенсивного та стійкого дегідратуючого ефекту.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дегідратуюча терапія рефортаном-плюс (як самостійна, так і в комбінації з дексаметазоном) є більш доцільною, особливо враховуючи його реологічну дію.